

کلید های طلازی سلامت

برای

آینده ای شیرین تر از گذشته

در دوران یائسگی



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

اداره سلامت میانسالان

نوشته: دکتر مطهره علامه

۱۳۸۸

زنان و مردان گرامی

همانطور که میدانید همه زنان و مردان در یک دوره از زندگی خود بطور طبیعی دچار کاهش هورمونهای جنسی مردانه یا زنانه شده و دوره باروری آنها خاتمه می یابد . به این دوره در زنان یائسگی (منوپوز) و در مردان آندروپوز می گویند .

یائسگی طبیعی به دوره ای از زندگی زنان اطلاق میشود که تخدمانها تولید استروژن را متوقف می کنند. این دوره معمولاً با قطع قاعدگی به مدت یک سال بدون آنکه بیماری یا اختلال خاصی وجود داشته باشد شناخته می شود . سن متوسط شروع یائسگی ۵۱ سال (از ۴۷ تا ۵۳ سال) است . یائسگی زو درسن در سن زیر ۴۰ سال اتفاق می افتد . زنان حدود یک سوم عمر خود را در این دوره بسر می برند . دوره یائسگی بطور متوسط ۴ سال طول می کشد. و ممکن است چند سال قبل از قطع قاعدگی شروع شود .

شما اکنون ۴۵ بهار یا بیشتر از عمر تان را سپری کرده اید . پس از سالهای طولانی که فقط و فقط به همسر و فرزندان خود اندیشیده و بعنوان همسر و مادر تمام وجود تان را وقف سعادت و سلامت خانواده خود کرده اید اکنون شرایطی فراهم شده است تا کمی به خود تان بیان دیشید . امروز با کوله باری از تجربیات تلخ و شیرین زندگی خود کار آمد تر از همیشه در میدان عمل زندگی قرار گرفته اید . تجربیاتی که به قیمت گرانی بست آورده اید می توانید در اختیار عزیز ترین افراد خانواده خود قرار دهید و خود تان نیز در مسیر آینده زندگی از آن بهره مند شوید . اگر نسبت به دوره سنی یائسگی احساس مثبتی ندارید احتمالا تحت تاثیر برخی عقاید فرهنگی خاص در زمینه سالخوردگی قرار گرفته اید که از مادران و دیگر بستگان و آشنایان خود شنیده اید یا در رسانه ها دیده اید و خوانده اید . برای اینکه تصویر تان از آنچه که در مورد خود ساخته اید تغییر کند موارد زیر را در نظر بگیرید :

۱- چشمانتان را بیندید و زبان زیر را در سنین مختلف یائسگی و پیش از آن مجسم کنید و خصوصیات آنها را همانطور که به نظر تان می رسد در جدول یادداشت کنید :

سن	شکل ظاهری	احساسات فرد	شکل حرکت	شكل صحبت	سایر خصوصیات
زن ۵۰ ساله					
زن ۶۰ ساله					
زن ۷۰ ساله					

برای هر یک از موارد سه صفت ذکر کنید .

آیا دوست دارید زنانی که مجسم کرده اید خودتان باشید یا خیر . اگر نه می خواهید چگونه باشید ؟ تصویر شما برای آینده خودتان چیست ؟ حال خصوصیات مورد علاقه خودتان را لیست کنید . مطمئن باشید میتوانید آینده مورد علاقه خودتان را رقم بزنید آینده شما به دستان خودتان ساخته می شود .

۲- پیام هایی که دریافت می کنید فیلتر کنید .

پیامهای منفی را نشنیده بگیرید و به آنها اهمیت ندهید . این پیامها از جاهای مختلف به شما منتقل شود و پیامهای مثبت را جایگزین نمایید .

پیامهای مثبت	پیامهای منفی
زنان پس از حاتمه نقش مادری باید مجددا خودشان را نشان دهنده و پلی برای آینده خود زده و طرحهای ناتمام خود را پیاده کنند و اهداف جدید زندگی خود را تعریف کرده و انگیزه های خود را تقویت کنند .	وقتی فعالیتهای مادری در یک زن حاتمه یافت انگیزه ای برای زندگی وجود ندارد
زنان در سن یائسگی توانمندیهایی دارد که بستگی به تجربیات تمام زندگی آنها دارد در دوران یائسگی آنها توانمندتر و کار آمدتر از هر زمان دیگری هستند	زنان در سن یائسگی ناتوان و ناکارآمد میشوند
زنان در سن یائسگی با پیدا کردن دوستان جدید در مکانهای ورزشی، جلسات مذهبی ، سایر اجتماعات می توانند پر مشغله ترین دوران زندگی را برای خود فراهم کنند و همچنین روابط خانوادگی و اجتماعی را تقویت کنند .	زنان در سن یائسگی تنها تر از هر زمانی هستند زیرا فرزندان آنها مستقل می شوند و از خانه خارج می شوند .

<p>زنان در سن یائسگی می توانند دست به فعالیت های اجتماعی تازه ای مانند شرکت در کلاس های آموزشی برنامه های انتخاباتی و ... بنزند . حتما در این دوره مشاغل جدیدی را تجربه می کنند .</p>	<p>زنان در سن یائسگی باید در خانه بمانند</p>
<p>بسیاری از زنان در سن یائسگی نیز در کلاس های مختلف شرکت می کنند و چیز های متفاوت فرامی گیرند . مواردی وجود دارد که زنان در همین دوره سنی به دانشگاه راه یافته اند و یا تجربیات و خاطرات خود را نوشه و منتشر کرده اند .</p>	<p>یادگیری در سن یائسگی تعطیل می شود .</p>
<p>ارزش زنان به جوانی و تمایلات جنسی آنان بستگی دارد . آنان بستگی دارند .</p>	<p>ارزش زنان به جوانی و تمایلات جنسی آنان بستگی دارد .</p>

با اقدامات مثبت شما می توانید نسبت به زندگی بعد از ۵۰ سالگی دید خوبی داشته باشید در باره دیدگاهها ، برنامه زندگی و فعالیت هایتان با دوستانتان صحبت کنید و نظریه مثبت درباره استعدادهای بشر در سن بالا را در ناخوداگاه خودتان جا داده و با تصورات سنتی درباره خودتان مبارزه کنید .

۳- به برخی از ویژگیهای دوران یائسگی که جنبه های مثبت و موهبت های آن هستند بیندیشید . :

رفع انتقباضات در دنک عضلات

رفع درد لگن در حین تخمک گذاری

رفع علائم روحی پیش از قاعده‌گی

رفع نگرانی از حاملگی ناخواسته و برقراری ارتباط زناشوئی بدون قرس از حاملگی

تکرار تجربه مثبت سالهای اول زندگی بعد از ازدواج بدون حضور فرزندان

۴- یاد بگیرید با علائم دوران یائسگی از قبیل گرفتگی و ... چگونه برخورد کنید تا این علائم تخفیف نیافته شما را آزار ندهد.

در این مجموعه روش برخورد با هر یک از علائم یائسگی فراخواهید گرفت تا بتوانید از علائم پیشگیری کنید یا با آن تطابق حاصل فرمایید.

۵- صفات مثبت را برای ارتباط با دیگران تقویت کنید.

جاهطلبی و پرشاشگری از زوای شما را تشدید می کند.

جوائز هارا دوستدارید و به آنها با مهربانی رفتار کنید

زمان استراحت روزانه را محدود نکنید و اوقات فراغت خود را با دوستان، آشنایان، بستگان بگذرانید.

۶- شیوه زندگی سالم را انتخاب نموده و آن را به یک عادت روزمره زندگی خود تبدیل نمایید

مراقبتهاي بهداشتی

متاسفانه بسیاری از زنان به علائم مختلف خود در این دوره بی توجهی دارند و آن را به افزایش سن نسبت می دهند . امیدوارم شما از این گروه نباشد . به سلامت خود توجه داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید .

شما از سن ۴۵ سالگی نیاز به یک سری مراقبتهاي بهداشتی پزشكی داريد که باید آن را در برنامه زندگی خود بگنجانيد
برای انجام مراقبتهاي فوق به نکات زیر توجه کنید :

- یک پزشك عمومي را انتخاب کنيد اگر به پزشك دسترسی نداريد ماما نيز می تواند به شما کمک کند
- توجه داشته باشيد پزشكی که انتخاب می کنيد نگرش مثبت نسبت به پدیده يائسگی و مسائل دوره يائسگی داشته باشد و برای پاسخ دادن به سوالات و نگرانیهاي شما وقت کافي اختصاص دهد
- شما در مراقبتهاي سالانه نیاز به یک معاینه كامل شامل موارد زير داريد :
 - بررسی فشار خون، معاینه قلب و ریه ،معاینه شکم، معاینه پستان ها، معاینه ناحیه تناسلی و لگن .
 - هم چنین لازم است برخی آزمایشهاي ضروري را با تشخيص پزشك انجام دهيد .
- علائم و تاریخ شروع قاعده‌گی های خود را به طور منظم یادداشت کنید تا زمان يائسگی و قطع قاعده‌گی شما مشخص باشد.
- سوالهایي را که در باره سلامت خودتان داريد یادداشت کنید و هنگام مراجعت به پزشك همراه داشته باشيد
- توجه داشته باشيد که از پزشك خود درباره مهمترین اولویتهاي سلامت خود شامل موارد زير پرس و جو کنيد و از سلامت كامل خود مطمئن شويد :

تغذیه، ورزش، سلامت استخوان‌ها و عضلات، سلامت قلب، مشکلات خلق و خو و خواب و استرسها، بیماری‌های شایع این دوران مانند: دیابت، فشار خون، چربی خون، علائم یائسگی، خونریزی‌های غیر طبیعی، هورمون درمانی، داروها و مکمل‌های مورد نیاز

- ممکن است در برخی موارد پزشک عمومی شما را به متخصص مربوطه از جمله متخصص تغذیه، کارشناس یا مربی ورزش، متخصص زنان یا داخلی و.....رجوع بدهد.
- اگر بنا به تشخیص پزشک عمومی نیاز به خدمات تخصصی در هر یک از زمینه‌ها داشته باشد پیگیری بفرمایید.
- از پزشک خود درباره مکمل‌های مورد نیاز سوال کنید تا نوع و مقدار مکمل مورد نیاز را برای شما مشخص کند.
- بدون نظر پزشک مکمل مصرف نکنید.

و بطور خلاصه با کمک پزشک:

نیازهای سلامت خود را بشناسید و شیوه زندگی خود را با این نیازها تطبیق دهید
مشکلات سلامت خود را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها تلاش کنید.

امتیازهای خود را بشناسید و با بهره گیری از این امتیازها به توانمندی و سلامت هر چه بیشتر خود کمک کنید
به زنگ خطرها و هشدارهای پزشک توجه کنید.

مراجعات پزشکی منظم را برنامه ریزی کنید.

ظاهر شما در دوران یائسگی

با افزایش سن در دوران یائسگی و پس از آن ممکن است تغییرات زیر در ظاهر زنان اتفاق بیافتد :

۱- افزایش وزن

۲- تغییرات پوستی

۳- تغییر شکل ستون فقرات

گرچه با کاهش هورمون استروژن و افزایش سن ناگزیر تغییرات فوق اتفاق می افتد اما عوامل خاصی از تسریع فرایند پیرشدن و تغییر شکل ظاهری اثر نموده و سبب می شوند زنان سالهای گذار یائسگی را با چهره ای شاداب زیبا و جذاب تر از همیشه بگذرانند . این عوامل عبارتند از :

- وضعیت جسمی و شرایط روحی و عاطفی
- احساس سلامتی خوشنودی و نشاط و نگرش مثبت به خود
- کاهش مصرف غذاهای پر انرژی مانند چربی و روغن، شیرینی جات ، گوشت قرمز ، آرد بدون سبوس
- انجام فعالیت فیزیکی و تمرینات بدنی کافی مانند پیاده روی ، دویدن آهسته و
- استفاده از غذاهایی مانند جبویات، سبزیجات ، میوه و لبیات فاقد چربی
- کاهش تماس با آفتاب بخصوص در افرادی که پوست روشنی دارند . آفتاب به لایه الاستیک پوست آسیب می رساند و حمایت پوست را کاهش داده و موجب چروک می شود . استفاده از کرمهای ضد افتاب و کلاه و عینک افتایی مانع اثرات منفی آفتاب بر چهره می شود .
- قطع مصرف سیگار سبب کاهش خون رسانی به پوست و عدم تغذیه مناسب آن شده و کاهش رطوبت و قوام پوست و در نتیجه چروک ان را سبب می شود .
- مصرف مکمل ویتامین A (بتا کاروتون محلول در آب) از طریق مواد غذایی مانند هویج، سبب زمینی، کدوی زرد و میوه های زرد و قرمز مانند فلفل و سبزیجات سبز تیره
- استفاده منظم و مستمر از کرمهای مرطوب کننده

- کاهش مصرف آب و صابون
- محدود کردن استفاده از مواد آرایشی حاوی مواد شیمیایی فراوان
- پیاده روی در هوای آزاد و فراهم نمودن شرایط تنفس بهتر پوست
- انجام حرکات کششی، یوگا، پیاده روی روزانه برای کاهش خستگی عضلات و مفاصل
- تغذیه مناسب و ورزش برای حفظ وزن مناسب

تغییرات ظاهری بدن بیشتر نتیجه افزایش سن هستند و یا سگی کمتر روی آنها اثر می گذارد.

با زندگی سالم و معنی دادن به زندگی می توان تغییرات فوق را به حداقل ممکن رساند.

این مسئله به ما میگوید که چرا بعضی افراد مسن جوان بنظر می رسند و بعضی افراد جوان مسن به نظر می آیند.

مواظب روابط زناشویی وسلامت دستگاه تناسلی ادراری خود باشد.

تمایل به داشتن روابط زناشویی یک احساس کاملاً عادی و طبیعی هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان می‌باشد.

این میل می‌تواند در طول زمان در مردان و زنان تغییر کند و بسته به شرایط افزایش و کاهش پیدا کند.

در دوران میانسالی، یائسگی سبب تغییر در تمایل به انجام روابط زناشویی در خانم‌ها می‌شود. از مهمترین

علل آن کمبود استروژن (هورمون زنانه) و همچنین تغییراتی در دستگاه تناسلی زنان می‌باشد.

دوران یائسگی برای برخی از زنان افزایش و برای اغلب آنها کاهش فعالیت جنسی را در پی دارد.

از آنجایی که در این سنین خانمها نگرانی از جهت حامله شدن ندارند و همچنین مسئولیتهای بچه داری شان

کمتر شده است بهمین دلیل داشتن رابطه زناشویی می‌تواند با آرامش خیال و بالذت بیشتری نسبت قبل از

یائسگی همراه باشد.

با این وجود عوامل بسیاری نیز ممکن است به کاهش رابطه جنسی در سنین یائسگی منجر شود که اغلب آنها نیز

قابل حل هستند.

این عوامل عبارتند از:

- حساسیت، سوزش مهبل و حشکی واژن: ادامه روابط جنسی و مشاوره با پزشک برای استفاده از

استروژن‌های موضعی و یا ژل‌ها و پماد‌های موضعی به رفع آن کمک می‌کند.

- مصرف داروهایی مانند ضد افسردگی‌ها، آرامبخش‌ها و ضد فشار خون بالا که در زمان یائسگی

بیشتر استفاده می‌شود، نیز می‌تواند سبب کاهش تمایل به روابط زناشویی در زنان گردد. در چنین

مواردی می‌توانید از پزشکتان بخواهید برای شما داروی جایگزین تجویز کند.

- افتادگی اندامهای لگن از قبیل رحم و مثانه علاوه بر مشکلات دیگری که ایجاد می‌کند روابط

زناشویی را نیز ناخواهایند می‌کند. برای پیشگیری از این امر از تمرینات لگن به صورت زیر

استفاده کنید:

تمرین کگل: این تمرینات در همه حال (ایستاده، نشسته، خوابیده) قابل انجام و بسیار ساده است. کافی است عضلات ناحیه تناسلی خود را به گونه‌ای منقبض کرده و به سمت داخل بکشید که گویی می‌خواهید جلو ادرار کردن را بگیرید. وضعیت اقباضی را تا ۱۰ ثانیه نگاه دارید و سپس عضله را رها کنید. این کار را روزانه ۳ تا ۴ بار و هر بار تا ۱۰ اقباض تکرار کنید. برای گرفتن نتیجه مطلوب ۶ تا ۱۲ هفته ادامه دهید.

- مشکلات روحی و روانی مثل اضطراب، افسردگی، استرس، ناراحتی، خستگی، اندوه و ... که در سنین یائسگی بیشتر شایع است در کاهش روابط زناشویی در این سنین نقش دارد. برای برطرف نمودن چنین مشکلاتی حتماً جهت مشاوره و روان درمانی مراجعه نمایید.
- همتر از همه اینکه برقراری روابط زناشویی ارتباط بسیار زیادی با احساس شما نسبت به همسر قان دارد. اکثر خانم‌ها رابطه جنسی را برای این برقراری می‌کنند تا بتوانند صمیمیت بیشتری با همسر یا شریک زندگی‌شان داشته باشند و احساسات او را بیشتر به سمت خود جلب کنند. بنابراین هرچه میزان محبت و صمیمیت بین زوجین بیشتر باشد و آنها احساس خوشایندتری در مورد یکدیگر داشته باشند تمایل به داشتن روابط زناشویی در آنان بیشتر خواهد بود.

امام صادق (ع) فرموده اند: هرگاه کسی را دوست داشتی به او بگو زیرا این اظهار دوستی عشق و علاقه شما را نسبت به هم افزون تر و مستحکم تر می‌کند.

رعایت نکات زیر می‌تواند در تحکیم و بهبود رابطه بین شما و همسر قان کمک زیادی نمایند و نهایتاً منجر به بهبودی روابط زناشویی قان گردد. قبل از هر چیز به این نکته توجه داشته باشید که هر زوج باید بتوانند علیرغم بالا رفتن سن از تمامی احساسات جنسی چه جسمی چه عاطفی لذت ببرند:

۱. محبت خود را به همسر خود ابراز نموده و علاقه خود را نسبت به او بیان نمایید.
۲. به مناسبتهای مختلف مانند روز تولد سال، روز عقد و ازدواج روز زن روز پدر با توجه به شرایط اقتصادی و توان خانواده به همسر خود هدیه بدهید.
۳. خوشرو باشید و با همسر خود چهره‌ای گشاده داشته باشید.
۴. با همسر خود صحبت کنید.
۵. از رفたりهای مثبت و صفات و ویژگیهای ظاهری همسرتان تعریف کنید.
۶. با همسر خود درباره امور مشترک زندگی مشورت کنید.
۷. در صورت برخورد اختلافات به شخصیت همسر خود ایراد نگیرید.
۸. از همسر خود بخاطر کارهای کوچک و بزرگی که بخاطر شما و خانواده تان انجام می‌دهد تشکر و قدردانی کنید.
۹. در حضور جمع و در میهمانیها که هم شما و هم همسرتان حضور دارید هرگز حتی بصورت شوخی و طنز به یکدیگر بی احترامی نکنید
۱۰. از بکارگیری کلماتی که بار منفی را به همسرتان انتقال می‌دهد جدا خودداری نمایید.
۱۱. توجه داشته باشید که تماس فیزیکی زن و شوهر فقط شامل روابط جنسی بین آنها نیست.
۱۲. نیازهای جنسی خود را بیان نمایید و تمایلات همسر خود متقابلاً مورد توجه قرار دهید.
۱۳. توجه داشته باشید تا زمانی که یکسال از قطع قاعده‌گی شما نگذشته باشد، تنظیم خانواده و استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری راجدی بگیرید.

برای پیشگیری از حاملگی در سالهای اخر باروری چه باید کرد؟

یک زن مسن تر در حوالی یائسگی در صورتی که شرایط خاص پزشکی نداشته باشد . برای پیشگیری از حاملگی می تواند از هر متده استفاده نماید .

اما در حوالی یائسگی باید به نکات زیر در انتخاب روش توجه کرد :

زنان بالاتر از ۳۵ سال سیگاری نباید از قرصهای هورمونی ترکیبی یا روشهای استروژنی استفاده کنند.
زنان بالاتر از ۳۵ سال مبتلا به میگرن نباید از قرصهای هورمونی ترکیبی یا روشهای استروژنی استفاده کنند.
قرصهای پیشگیری اورژانسی از بارداری در هر دوره سنی از زندگی زنان میتواند مورد استفاده آنان قرار گیرد حتی در افرادی که نمی توانند بطور مستمر از روشهای هورمونی استفاده کنند . استفاده از قرصهای پیشگیری اورژانسی از بارداری مانع ندارد.

استفاده از روشهای هورمونی پروژسترونی مانند قرص شیردهی، آمپول سه ماهه، روش کاشتی و آی یودی پروژسترونی در این گروه زنان در صورتی که شرایط پزشکی خاص نداشته باشند ، بلامانع است.
TL و واژکتومی برای آن دسته از زنان گروه هدف که خانواده خود را تکمیل نموده اند انتخاب مناسبی است .
کاندوم با توجه به کاهش قدرت باروری انتخاب خوبی است .

انواع UD آنیز مناسب می باشد

در خصوص خونریزیهای غیر طبیعی در این دوره با پزشک مشورت کنید.

در دوران یائسگی الگوهای متعددی برای خونریزی وجود دارد و شما ممکن است با پدیده هایی مانند موارد زیر مواجه شوید:

"یک ماه به دلیل خونریزی شدید نمی توانم از خانه خارج شوم ولی ماه بعد اصلاً خونریزی ندارم."

"آقader خونریزیهای من از حالت عادی خارج شده که نمیدانم ما بعد خونریزی من چگونه است"

"ماه گذشته اصلاً عادت نشدم نمیدانم یائسه شدم یا نه؟"

"زود به زود عادت ماهیانه می شوم و نمیدانم یائسه شدم یا نه و مرتب لکه بینی دارم."

همه اینها و سایر مواردی که ممکن است از نزدیکان خود شنیده باشد، الگوهای مختلف خونریزی قاعده‌گی در دوران یائسگی هستند و تا زمانی که یائسگی قطعی اتفاق نیفتد ممکن است اشکال مختلفی از خونریزی را داشته باشید. این مسئله بدلیل تغییرات ترشح هورمونهای تخدمانی و بهم خوردن نظم تحمل گذاری است.

الگوهای مختلف خونریزی معمولاً نگران کننده نیستند مگر آنکه خونریزی شدید یا طولانی مدت باشد. یا لکه بینی طولانی مدت وجود داشته باشد.

در صورت خونریزی شدید یا طولانی مدت انجام تکه برداری از پوشش داخلی رحم و کورتاژ (D&C) برای متوقف کردن خونریزی ورد احتمال سرطان رحم انجام می شود. اگر مشکل سرطان وجود نداشته باشد. درمانهای دارویی مناسبی برای حل مشکل وجود دارد. در بعضی موارد خونریزی بعلت فیبروم اتفاق می افتد که در صورت خونریزی زیاد ناشی از توده های خوش خیم فیبروم باید مشورت با پزشک برای جراحی توده با برداشتن رحم صورت گیرد.

در بعضی موارد سرطان دهانه رحم (سرویکس) نیز موجب لکه بینی یا خونریزی می شود. بنابراین انجام پاپ اسمیر از ضروریات معاینات و مراقبتهای سالانه خانمها در دوران یائسگی است.

توجه کنید هر گونه خونریزی شش ماه پس از قطع قاعده‌گی نیاز به بررسی بیشتر و مراجعته به پزشک دارد، زیرا در اینگونه موارد احتمال خونریزی غیر طبیعی به دلیل بد خیمی بیشتر است.

اجازه ندهید گر فتگی آزار تان دهد

گر فتگی یکی از شایع ترین علائمی است که اکثریت زنان در دوران یائسگی آنرا تجربه می کنند. این حالت با گرم شدن شدید قسمت بالایی بدن (سر و صورت گردن و قفسه سینه) اشروع می شود. و ممکن است به صورت موجی به کل بدن پخش شود. پس از آن فرد دچار تعریق شده و احساس سرما می کند. این اختلال بیشتر در شبها اتفاق می افتد و ممکن است مانع خواب واستراحت شود. در اثر بهم خوردن الگوی خواب فرد دچار احساس خستگی تحریک پذیری عدم تمرکز و افسردگی می شود. در بسیاری از موارد طول هر دوره از ۳۰ ثانیه تا ۵ دقیقه متفاوت است و از روزی به روز دیگر هم فرق می کند. ۲۵ درصد از زنان از گر فتگی شدید شاکی هستند و در بعضی از زنان اصلاً اتفاق نمی افتد. این علائم معمولاً به آهستگی ظرف مدت ۳ تا ۵ سال بدون درمان از بین می رود.

برای مقابله با گر فتگی به توصیه های زیر عمل کنید:

۱. از لباسهای نخی و روشن استفاده کنید و چند لایه پوشید تا بتوانید در موقع گرم شدن لباسهای را کم کنید.
۲. محیط زندگی را تا حد امکان خنک نگه دارید و یک وسیله خنک کننده مثل بادبزن همراه داشته باشید.
۳. در جای خنک و با تهویه کافی بخوابید.
۴. بجای مایعات گرم از نوشیدنی هایی مثل آب یا آب میوه خنک استفاده کنید.
۵. الکل و سیگار را قطع کنید و تا حد امکان از ادویه جات در غذا استفاده نکنید.
۶. ورزش سبک مثل قدم زدن در هوای آزاد را بطور منظم انجام دهید.
۷. از رژیم غذایی سبک (صرف بیشتر میوه جات و سبزی جات و شیر و ماست) استفاده کنید.
۸. وزن خود را کنترل کنید.
۹. از تکنیک های ارام سازی بخصوص تنفس عمیق و آهسته و ماساژ استفاده کنید.

۱۰. از لباس خواب و ملافه مناسب استفاده کنید که امکان تنفس پوست را فراهم کند.

در صورتی که با اقدامات زیر گرگفتگی شما بهبود نیافت اطمینان داشته باشید که با یک مراجعت ساده

به پزشک و دریافت داروهای مناسب بطور کامل این مشکل شما درمان می شود .

گرگفتگی از شایعترین و آزاردهنده ترین علائم دوران یائسگی است ، اما مقابله با آن بسیار ساده است . با
اقدامات صحیح و به موقع مانع شوید که گرگفتگی آزارتان دهد .

شیوه زندگی خود را بهبود دهید

یکی از مهمترین نتایج تغذیه صحیح و فعالیت بدنی کافی حفظ تناسب اندام و وزون مناسب است که خود سبب پیشگیری از بیماریهای مهمی مانند بیماری قلبی عروقی، بیماریهای عضلانی استخوانی، سرطانها و اختلالات روانی شده و سلامت عمومی فرد را تصمیم می کند.

برای تعیین وزن و تناسب اندام پس از اندازه گیری قد و وزن خود شاخص توده بدنی را محاسبه کنید.

وزن

$$\text{شاخص توده بدنی} = \frac{\text{وزن}}{\text{قد} \times \text{قد}}$$

اگر عدد بدست آمده از ۲۵ بالاتر یا از ۱۹ پایین تر باشد لازم است برای دریافت توصیه های لازم به پزشک مراجعه کنید. اصول مهم شیوه زندگی سالم فعالیت فیزیکی کافی، تغذیه مناسب و صحیح و ترک عادات مضر هستند.

فعالیت فیزیکی مناسب را در سر لوحة برنامه های روزمره زندگی خود قرار دهید

اگر حداقل سه روز در هفته و هر روز حداقل به مدت ۳۰ دقیقه یکی از ورزش های متحمل وزن یا غیر متحمل وزن یا کارهای منزل را انجام می دهید میزان فعالیت فیزیکی شما مطلوب است.

ورزش منظم سبب افزایش قدرت عضلانی، تعادل، افزایش قدرت و استحکام استخوانها، کاهش احتمال زمین خوردن و شکستگی ناشی از آن می شود فعالیت ورزشی باید بگونه ای تنظیم شود که سبب فشار زیاد بر استخوانها و افزایش احتمال شکستگی نشود. حرکات ورزشی زیر برای پیشگیری از پوکی استخوان در زمان کمتر از ۶۰ سال مؤثر است:

- ۱- ورزشهای متحمل وزن بدن مناسب ترین تمرينها برای سلامت استخوانها و عضلات هستند که در آنها فعالیت عضلات و استخوانهای بدن در برابر نیروی جاذبه انجام می گیرد و وزن بدن توسط رانها و پاها حمل می شود. مانند پیاده روی، دویدن آهسته، کوه پیمایی، انجام حرکات هوایی باشد ملايم، حرکات موزون، بالارفتن از پله ها ورزشهای راکتی. انجام اين ورزشها سه بار در هفته هر بار به مدت ۳۰ دقیقه به پیشگیری از پوکی استخوان کمک می کند.
- ۲- تمرينهای قدرتی مانند کار با وزنه های دستی نوارهای ارجاعی و دستگاههای متنوع وزنه برای افزایش توده و قدرت عضلانی واستحکام استخوانها

در انجام ورزشها باید اصول زیر رعایت شود:

- ۱- گرم کردن بدن در ابتدا و سرد کردن در انتهای آن با انجام چند دقیقه حرکات فرمی ملايم
- ۲- مشورت با پزشک در صورتی که مشکل سلامتی خاص بخصوص مشکلات قلبی وجود دارد
- ۳- افزایش تدریجی مدت زمان ورزش: با ۱۰ دقیقه شروع کنید و هر هفتۀ حد اکثر ۵ دقیقه افزایش باید تا به ۳۰ دقیقه برسید.
- ۴- از انجام حرکاتی که منجر به خم شدن بیش از حد ستون فقرات می شود، پرهیز کنید. توجه کنید افراد مبتلا به پوکی استخوان اثبات شده نباید به انجام ورزشهای سنگین متحمل وزن و قدرتی پردازند زیرا وزن بدن هم در این افراد می تواند سبب فشار آوردن به مهره ها و شکستگی آنها شود. در این افراد انجام تمرينات هوایی در آب، شنا کردن، ورزشهای هوایی نشسته و آرام با کمک صندلی یا دوچرخه ایده آل است.

به خاطر بسپرید برای ورزش کردن و حفظ تناسب اندام و افزایش سلامت عمومی نیازی به سالنهای ورزشی و وسائل پیچیده و گرایی نیست. نزدیکترین وارزانترین سالن ورزشی خیابانها و پارک محله شماست و پیاده روی مهمترین فرم ورزش هوایی است که شما می توانید برای حفظ سلامت خود انجام دهید.

اگر مانع برای انجام ورزش دارید با پزشک خود مشورت کنید. همچنین اگر تا کنون ورزش نکرده اید برای شروع ورزش با پزشک خود مشورت کنید البته همیشه با پیاده روی شروع کنید.

در هیچ شرایطی حتی هنگام مطالعه و تماشای تلویزیون نیز حرکت کردن را کنار نگذارید. دوچرخه زدن یا انتباخت عضلات ران یا تمرینات کل در این زمانها قابل انجام هستند.

سعی کنید رعایت اصول تغذیه صحیح به صورت عادت دائمی در زندگی روزمره شما دارد

برای یک تغذیه صحیح و متناسب با سن خود در صورتیکه مشکل خاصی ندارید در غذای روزانه خود موارد زیر را بگنجانید و سهم های مورد نیاز از هر یک از دستجات غذایی را بر حسب نوع غذاهای مصرفی روزانه خود در وعده های مختلف صبحانه ناهار شام یا میان وعده ها تقسیم کنید:

۱- روزانه سه سهم لبنیات مصرف کنید. توجه داشته باشید هر لیوان شیر یا ماست یا $1/5$ قوطی کبریت پنیر معادل یک سهم لبنیات است.

۲- روزانه ۵ سهم میوه و سبزی مصرف کنید. یک فنجان سبزی یک عدد میوه درشت یا یک فنجان میوه ریز یک سهم محسوب می شود.

۳- روزانه حداقل ۶ سهم نان و غلات شامل برنج نان ماکارونی و ذرت استفاده کنید . یک کف دست نان سنگک و تافتون و بربری یا ۴ کف دست نان لواش یا نصف لیوان برنج یا سایر غلات پخته یا نصف لیوان ماکارونی یک سهم غلات محسوب میشود .

۴- حداقل دوبار در هفته ماهی مصرف کنید . مصرف گوشت قرمن را محدود کنید . حبوبات ، تخم مرغ و مغزه را به عنوان یک جایگزین خوب با گوشت در برنامه روزانه در نظر بگیرید .

میزان مصرف این گروه غذاها ۲ سهم در روز است که هر سهم معادل ۳-۲ قطعه گوشت پخته شده ۶۰ گرمی یک ران یا نصف سینه مرغ پخته یا یک لیوان حبوبات پخته یا ۲ عدد تخم مرغ است .

۵- مصرف مواد غذایی چرب سرخ کردنی روغن جامد لبندی پر چربی و روغنها نباتی را کاهش دهید و از روغنها مایع بویشه زیتون ، آفتاب گردان ، ذرت ، هسته انگور ، سویا ، روغن ماهی استفاده کنید . برای سرخ کردن از روغن مخصوص سرخ کردن استفاده کنید .

۶- از مصرف نمک اضافی و غذاهای نمک سود ، افزودنیها ، سسها نوشابه ها و شیرینی جات را تا حد امکان خودداری کنید .

۷- در طول روز به اندازه کافی آب بنوشید .

عادات مضر را ترک کنید :

- سیگاری بودن : سیگار یهای عموماً لاگرتر هستند زودتر به یائسگی می رسد استروژن درونساز در آنها زودتر از بین می رود و بیشتر دچار شکستگی می شوند . همچنین بیماری قلبی عروقی و سرطانها در آنها افزایش می یابد . ترک استعمال دخانیات را در این گروه توصیه کنید .
- مصرف الکل به دلیل کاهش دانسیته استخوان و افزایش ریسک سقوط خطر شکستگی را افزایش می دهد .
- مصرف زیاد کافئین نیز به استحکام استخوانها صدمه می زند .

در صورت مصرف سیگار و قلیان یا وجود هر گونه رفتار مخاطره آمیز دیگر مانند مصرف داروهای روانگردانِ الکل و رفتار صحیح را به بیمار توصیه کنید.

سعی کنید خوب بخوابید

احساس خستگی علامت شایعی در دوره یائسگی است . سخت به خواب رفتن ، زود از خواب بیدار شدن ، نیمه شب بیدار شدن بخصوص بدليل گرفتگی و تعریق شبانه یا احساس نیاز به دستشویی ممکن است وجود داشته باشد . اجتناب از مصرف کافئین (قهوة) و مصرف یک لیوان شیر قبل از خواب به رفع مشکل خواب شبانه کمک می کند . توصیه های بهداشت خواب در بسیاری از موارد کمک کننده است . به توصیه های زیر توجه کنید :

- استفاده از رختخواب برای خوابیدن
- قطع مصرف داروهایی مثل کافئین ، نیکوتین ، الکل و محرکها
- پرهیز از چرخ زدن روزانه
- حفظ تناسب جسمانی به کمک برنامه تدریجی ورزش صبحگاهی
- استفاده بیشتر از رادیو یا مطالعه در حال آرامش به جای تماشای تلویزیون
- حمام آب داغ ۲۰ دقیقه قبل از خواب
- صرف غذا در ساعت معینی از روز
- میل نکردن غذای سنگین قبل از خواب
- استفاده از روش آرام سازی هنگام غروب
- فراهم کردن شرایط محیطی مناسب برای خواب راحت

با افسردگی و اضطراب مبارزه کنید

به نظر میرسد که زنان در دوران یائسگی تحریک پذیرتر و غمگین ترند و تغییرات حلقی آنها بیشتر می شود . علاوه بر تغییرات هورمونی عکس العمل همسر و سایر اطرافیان نسبت به این دوره استرسهای خانوادگی و دور شدن از فرزندان عوامل ایجاد چنین وضعیتی هستند .

برای پیشگیری از افسردگی و اضطراب به نکات زیر توجه کنید :

- در دنیا به همان اندازه که بهانه برای غم و غصه هست بهانه برای شادی نیز هست . نیمه پر لیوان زندگی را ببینید . و از نوشیدن جرعة های آن لذت ببرید .
- وقت خالی خود را با سرگرمیهای مناسب پر کنید و برنامه روزانه کاملی داشته باشید
- علایقی را که تا کنون به دلیل مشغله های مختلف به انها دست نیافرته اید دنبال کنید و در کلاسهای مورد علاقه قان از آشپزی تا نقاشی و ثبت نام کنید یا از CD های آموزشی در این زمینه ها استفاده کنید توجه داشته باشید برخی از خلاقيت ها در اين سن بروز پيدا می کند .
- به زیبایی خود توجه داشته و ظاهر خود را آراسته نگاه دارید .
- اگر سیگاری هستید سیگار را کنار بگذارید .
- نیمه دوم زندگی را بر پایه نیمه اول زندگی و با استفاده از تجرب دوره اول بنا کنید .
- یائسگی یک تراژدی نیست

امتیاز‌های این دوره زندگی خود را بشناسید: ثبات، احترام، خردمندی، عقل و منطق و تجربه از مزایای مهم این دوره زندگی شما هستند.

- بیماران مبتلا به افسردگی احساس غم و غصه، بی حوصلگی، بی اشتہایی، عدم لذت، احساس بی ارزشی، اختلال خواب، خستگی، ناتوانی، خستگی از زندگی و افکار خودکشی و مرگ دارند. در صورت وجود چنین علائمی حتماً آن را با پزشک در میان بگذارید و درمان مؤثر را شروع کنید

مواظب استخوانها و عضلات خود باشد

زنان پس از یائسگی به علت کاهش هورمون استروژن مستعد ابتلا به پوکی استخوان و در نتیجه شکستگی و خمیدگی انها هستند. استخوانها علیرغم ظاهر سخت خود به عنوان یک بافت فعال و زنده در طول دوران زندگی بطور مداوم در حال بازسازی هستند و کلسیم از آنها برداشت یا در آنها نشست می‌کند. اگر برداشت کلسیم بیشتر از نشست آن در استخوان اتفاق بیافتد استخوان استحکام خود را از دست می‌دهد و فرم و ضعیف و شکننده می‌شود و با یک ضربه حقیف احتمال شکستگی استخوان به خصوص در مناطقی مانند لگن و مهره‌ها پیش می‌آید.. کاهش هورمون استروژن در دوره یائسگی منجر به برداشت کلسیم از استخوانها می‌شود . آیا پوکی استخوان برای همه زنان در دوران یائسگی اتفاق می‌افتد؟

افزایش سن و یائسگی در زنان از عوامل خطری هستند که سبب ایجاد پوکی استخوان می‌شوند اما عوامل خطر دیگری احتمال بروزان را تشدید می‌کند این عوامل عبارتند از :

- لاغری مفرط
- سابقه پوکی استخوان در بستگان درجه یک
- نژاد آسیایی
- مصرف سیگار و الکل
- کمبود مصرف کلسیم و ویتامین D
- زندگی کم تحرک
- مصرف داروهایی مانند کورتیکو استروئیدها

چگونه از پوکی استخوان جلوگیری کنیم؟

- تغذیه از منابع غنی کلسیم و ویتامین D . مصرف روزانه سه لیوان شیر کم چربی یا معادل آن ماست و سایر لبنیات کلسیم مورد نیاز بدن را تامین می‌کند .

- ورزش منظم و تمرینات بدنی بویژه ورزشهایی که وزن بدن را تحمل می کند ، مانند پیاده روی ، دویدن آهسته ، کوه پیمایی ، حرکات موزون ، بالا رفتن از پله ها ، ورزش های راکتی به شرط آنکه حداقل سه بار در هفته هر بار به مدت ۳۰ دقیقه انجام شود ، به پیشگیری از پوکی استخوان کمک می کند .
- تامین ویتا مین D مورد نیاز بدن از طریق نور آفتاب با قرار دادن دستها و صورت سه بار در روز هر بار ۱۰ دقیقه یا مصرف مکمل ویتامین D به تشخیص پزشک
- ترک مصرف سیگار و الکل
- کاهش مصرف کافئین

توجه داشته باشید :

اگر بیش از ۵۰ سال سن دارید و یائسه شده اید ،
 اگر در طول زندگی خود به اندازه کافی کلسیم دریافت نکرده اید ،
 اگر سیگار می کشید ،
 اگر از داروهای کورتیکو استروئید استفاده می کنید ،
 اگر از نور خورشید محروم بوده اید ،
 اگر به اندازه کافی فعالیت بدنی ندارید ،
 اگر در بستگان درجه یک شما فرد مبتلا به پوکی استخوان وجود دارد ،

شما در معرض خطر پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن هستید . با اتخاذ شیوه سالم زندگی مانع بروز عواقب آن شوید .

در مقابل سرطان ایستادگی کنید

یائسگی عاملی برای سرطان نیست ولی با توجه به همزمانی دوره سنی یائسگی با شیوع برخی سرطانها توجه به این امر اهمیت زیادی دارد . مهمترین سرطانهایی که زنان در دوران یائسگی باید به فکر پیشگیری و تشخیص زودهنگام آن باشند عبارتند از :

- سرطان پستان از شایع ترین سرطانهای زنان است . معاینه ماهانه پستان توسط زنان و معاینه سالانه توسط پزشک و مامو گرافی در صورت توصیه پزشک از جمله اقداماتی است که برای پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان پستان باید صورت گیرد .
- در صورت خونریزی غیر طبیعی بویژه خونریزی زیاد و طولانی مدت و یا لکه بینی با پزشک مشورت نمایید .
- به انجام تست پاپ اسمیر برای تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم مبادرت کنید .
- در صورت تغییر رنگ و شکل خاکای روی بدن خود و یا خونریزی از انها با پزشک مشورت کنید .
- علائم گوارشی را جدی بگیرید و در صورت وجود نفخ ، تغییر اجابت مزاج ، سوزش و درد بالای شکم و سایر علائم گوارشی مزمن به پزشک مراجعه نموده و از سلامت خود مطمئن شوید .

توجه داشته باشید سرطان تخدان ممکن است با علائم گوارشی بروز کند همچنین سرطان کولون و رکتوم و سرطان معده ممکن است با علائم معمولی گوارشی خود را شان دهند .

در هر صورت :

برای پیشگیری از همه انواع دسرطان

با تغذیه صحیح و فعالیت فیزیکی مناسب از افزایش وزن جلوگیری کنید.

از مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدانها مانند میوه و سبزی به اندازه کافی استفاده کنید

از مصرف مواد غذایی حاوی چربیهای اشباع، سرخ کردنیها و نگهدارنده را در بر قایمه غذایی امتناع کنید

مراجعات منظم پزشکی را در سرطان خود قران قرار دهید

تست پاپ اسمیر و ماینه پستانها و در صورت تشخیص پزشک ماموکرافی را فراموش نکنید

اگر در خانواده و بستگان خود موردی از ابتلا به سرطان وجود دارد مسئله را جدی تر بگیرید

این مجموعه توسط :

دکتر مطهره علامه - اداره سلامت میانسالان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زیر نظر دکتر محمد اسماعیل مطلق برای استفاده زنان ۴۵-۶۰ سال هدف برنامه یائسگی تهییه شده است.

تایپ: ریحانه سنایی اشتیانی

طراحی: پردیس فریشی

