

بیضه نزول نکرده



تهیه و تنظیم :

واحد آموزش به بیمار

بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

سال ۱۴۰۱

مراقبت های بعد از عمل

✓ باتمیز نگهداشتن محل عمل جراحی از ادرار و مدفوع ، می توان تا حدی از عفونت محل عمل پیشگیری کرد .

✓ با مشاهده علائم عفونت ، باید سریعاً به پزشک مراجعه کرد . این علائم عبارتند از درد ، قرمزی در محل عمل و بروز تب ،

✓ کودک باید از فعالیت شدید و باز کردن پاهای خود به مدت حداقل چهار هفته پس از عمل خودداری کند . این مراقبت مانع از جابجایی بیضه می شود .

✓ مراجعه بعدی را طبق دستور پزشک انجام دهید .

منبع: نلسون - مارلو

مراقبت های قبل از عمل

✓ کودک یا نوزاد را استحمام کنید .

✓ باتوجه به نوع تغذیه بیمار ، ساعات ناشتا بودن جهت عمل متفاوت است ، بنابراین طبق دستور پزشک عمل شود .

بیضه نزول نکرده

در هفتمین هفته دوران جنینی بیضه ها در درون شکم و در نزدیکی کلیه تشکیل می شود . سپس در سه ماهه سوم از درون شکم وارد کانالی که در کشاله ران هرطرف قراردارد شده و به طرف کیسه بیضه مهاجرت می کنند و در حدود هفته سی و ششم دوران رحمی در کیسه بیضه مستقر می شود . عدم وقوع این اتفاق را پایین نیامدگی بیضه می نامند .

در اغلب موارد تا سه ماهگی بیضه خودبخود وارد کیسه می شود. اگر تا شش ماهگی بیضه وارد کیسه نشود ، حتماً باید درمان شود .

علل

علت اصلی آن شناخته شده نیست ، اما عوامل ارثی و هورمونی ممکن است در ایجاد آن نقش داشته باشد.

علائم

معمولاً هیچ علامتی ندارد . مهمترین یافته در این کودکان کیسه خالی بیضه است . گاهی به علت همراهی این بیماری با فتق یا هیدروسل والدین متوجه برآمدگی در کشاله ران می شوند . در پاره ای موارد به علت عدم نزول کافی و ثابت نشدن آنها بطور متناوب چرخش بیضه اتفاق می افتد که دردناک است باید سریع به پزشک مراجعه کرد .

تشخیص

تشخیص قطعی از طریق معاینه پزشک است . در ۸۰ درصد موارد پزشک می تواند بیضه ها را در کشاله ران حس کند ولی در سایر موارد پزشک ممکن است جهت تشیص دقیق تر از سونوگرافی و سایر روشهای تشخیصی استفاده کند .

درمان

در صورتی که بیضه تا ۶ ماهگی پایین نیاید ، درمان اصلی جراحی است . در این عمل ، جراح بیضه را داخل کیسه قرار داده و بخیه می زند . سن مناسب برای عمل ۶ تا ۹ ماهگی است .

هشدار

- با افزایش سن در کودکان مبتلا ، احتمال نا باروری افزایش می یابد.
- بنابراین مراجعات دوره ای به پزشک تشخیص زودرس این عارضه را امکان پذیر می سازد .
- بیضه ها نسبت به گرما حساسند و دمای داخل شکم بالاست . باقی ماندن بوضه در داخل شکم باعث خواهد شد سلولهای تشکیل دهنده آن دچار آسیب شوند.