

نوزادان متولد شده از مادر HBsAg⁺

- ❖ توصیه می شود در همه خانم های باردار، تست HBsAg⁺ به صورت غربالگری روتین برای تعیین نحوه ایمن سازی نوزادان انجام شود.
- ❖ ایمن سازی با ترکیبی از واکسن HB و ایمونوگلوبولین اختصاصی ضد HB (HBIG) می تواند مانع ابتلا نوزادان شود.
- ❖ در صورتی که نوزاد از مادر HBsAg⁺ متولد شده باشد، باید در اسرع وقت و ترجیحا طی ۱۲ ساعت اول پس از تولد، واکسن HB و ایمونوگلوبولین اختصاصی HB (HBIG) را دریافت کند. (از دو ناحیه متفاوت) ادامه واکسیناسیون HB طبق برنامه واکسیناسیون کشوری انجام خواهد شد. حداکثر مهلت دریافت ایمونوگلوبولین اختصاصی HB تا ۷ روز پس از تولد است.
- ❖ تمامی نوزادانی که از مادران HBsAg⁺ متولد شده اند حتی در صورت دریافت واکسن HB و ایمونوگلوبولین اختصاصی HB، باید از نظر وضعیت HBsAg و HBsAb طی ماه های ۹ تا ۱۸ پس از تولد بررسی شوند.



منابع:

راهنمای جامع هپاتیت ب دکتر سید موید علویان (استاد دانشگاه و فوق تخصص گوارش و کبد)
برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی